

漢方薬局一貫堂 胃腸薬 22 号(オウバク・タンナルピン・ビスマス散) 添付文書

成分及び分量	日本薬局方	オウバク末	30.0g
	"	タンニン酸アルブミン	30.0g
	"	次硝酸ビスマス	20.0g
	"	ロートエキス散	10.0g
	賦形剤	"	乳 糖
全 量			100g
用法及び用量	1回量を次のとおりとし、1日3回を限度とする。なるべく空腹時をさけて服用する。服用間隔は4時間以上おくこと。 大人(15歳以上)1包 2.0g、11 才以上 15 才未 満大人の 2/3、8 才以上 11 才未 満 大人の 1/2、5 才以上 8 才未 満 大人の 1/3、3 才以上 5 才未 満 大人の 1/4、1 才以上 3 才未 満 大人の 1/5、3ヶ月以上 1 才未 満 大人の 1/10		
効能及び効果	下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便、腹痛を伴う下痢。		
作 用	オウバク中のベルベリンによる腸内殺菌と、タンニン酸アルブミンによる収れん、ロートエキスによる鎮けい、ビスマスによる止瀉作用を期待したものである。		

【使用上の注意】

- 次の人は服用しないでください
慢性消化通過障害又は重篤な消化性潰瘍のある患者。
- 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
 - 今までに薬によるアレルギー症状（例えば発疹、発赤、かゆみなど）を起こしたことがある人。
 - 牛乳アレルギーのある人。
 - 高温環境にある人。
 - 発熱を伴う下痢のある人、高齢者。
 - 血便のある人、粘液便の続く人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる婦人。
 - 胃潰瘍、十二指腸潰瘍のある人。
 - 心臓障害、糖尿病、排尿困難な人、身体の弱っている人、高齢者。
 - 医師の治療を受けている人。
- 服用の際には、次のことにご注意ください。
 - 本剤は、劇薬に相当しますので、定められた用法・用量を厳守してください。
 - 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
 - 次の医薬品又はアルコール性飲料とは同時に服用しないでください。
他の胃腸鎮痛鎮痙薬、胃腸薬（ロートエキスを含む製剤）、鉄剤
 - 急性期の激しい下痢の場合又は嘔気、腹痛、腹部膨満などの症状を伴う下痢の場合、本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがありますので、このような場合には、服用については医師又は薬剤師にご相談ください。
 - 本剤は生後3ヶ月未満の乳児に服用させないでください。なお、生後3ヶ月以上であっても1才未満の乳児には、止むを得ない場合のほか服用させないでください。
- 服用中又は服用後は、次のことにご注意ください。
 - 本剤の服用により、アレルギー症状（例えば発疹、かゆみなど）があらわれた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。
 - 本剤の服用により、まれに口のかわきを生じることがあります。
 - 本剤の服用により、便の色が黒くなることがあります。
 - 本剤の服用により、めまい、目のかすみ、異常なまぶしさなどの症状があらわれることがありますので、自動車又は機械類の運転操作にはご注意ください。
 - 数日服用しても症状の改善がみられない場合には、服用を中止し、医師、歯科医師又は薬剤師にご相談ください。
 - 1週間以上続けて服用しないでください。
- 保管及び取り扱い上の注意
 - 小児の手のとどかない所に保管してください。
 - 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
 - 誤用を避け、品質を保持するため、多の容器に入れ替えないでください。
 - 1包の分割した残りを服用する場合には、残量を記載して保管し、2日以内に服用してください。

【製造販売元】

漢方薬局一貫堂 〒824-0005 福岡県行橋市中央 3-2-27 Tel&Fax 0930-26-2620

直接の容器又は、直接の被包に記載すべき事項

【注意】

- 1). 服用後は自動車などの運転をしないでください。
- 2). 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 3). 服用の際には、添付文書をよくお読みください。
- 4). 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。

No.002