

漢方薬局一貫堂 胃腸薬 7-① 添付文書

成分及び分量	日本薬局方 〃 賦形剤 〃	センブリ末 炭酸水素ナトリウム 乳 糖	3.0g 70.0g 適量
		全 量	100.0g
用法及び用量	1回量を次のとおりとし、1日3回、食前服用する。 大人(15歳以上)1包 0.5g、11才以上 15才未満 大人の2/3、8才以上 11才未満大人の1/2、5才以上8才未満 大人の1/3		
効能及び効果	食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸 焼け、もたれ、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔 のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐		
作 用	センブリの苦味による反射的胃液・唾液分泌を期待したもの		

【使用上の注意】

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
 - 1). 腎臓に障害のある人。
 - 2). 医師の治療を受けている人。
2. 服用の際には、次のことにご注意ください。
 - 1). 定められた用法・用量を厳守してください。
 - 2). 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
 - 3). 本剤は、5歳未満の乳幼児に服用させないでください。
3. 服用中又は服用後は、次のことにご注意ください。

2週間位服用しても症状の改善がみられない場合には、一時服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。
4. 保管及び取り扱い上の注意
 - 1). 小児の手のとどかない所に保管してください。
 - 2). 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
 - 3). 誤用を避け、品質を保持するため、多の容器に入れ替えないでください。
 - 4). 1包の分割した残りを服用する場合には、残量を記載して保管し、2日以内に服用してください。

【製造販売元】

漢方薬局一貫堂 〒824-0031 福岡県行橋西宮市1-8-8 桃坂店舗1号室 Tel 0930-26-2620

直接の容器又は、直接の被包に記載すべき事項

【注意】

- 1). 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 2). 服用の際には、添付文書をよくお読みください。
- 3). 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。

No.001